




- Dr William BARON
- Dr François BOUVET
- Dr Thierry BUREAU
- Dr Sébastien CAMPARD
- Dr Patrick CHOMARAT
- Dr Guillaume DEBEC
- Dr Lionel DESCHIENS
- Dr Thierry GAZEAU
- Dr Jean-Marie HUBERT
- Dr Edouard LEGRAND
- Dr Françoise LE MEUR
- Dr Martin LIARD
- Dr Bertrand MAUBRAS
- Dr Frédéric RICHE
- Dr Nelly RONDEAU
- Dr Christiane VINCENT
- Dr Gilles ROUAU



### SELARL Phileas.

Société d'Exercice Libéral de médecins spécialistes en Anesthésie-Réanimation

Tél : 02 51 17 30 31 - Fax : 02 51 17 30 32

Mail : secretariat@anesthesie-phileas.com

RDV internet : [www.anesthesie-clinique-jules-verne.fr](http://www.anesthesie-clinique-jules-verne.fr)

### 2 sites de consultation à votre disposition :

- **à Nantes** : Clinique Jules Verne. 2-4 route de Paris - 44314 Nantes cedex 3. Rez de Chaussée Haut  
Tramway ligne 1 (Station HALUCHERE) du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00
- **à Ancenis** : Maison médicale – 170, rue du Verger  
44 150 Ancenis

**AFIN DE VALIDER VOTRE ENTREE A LA CLINIQUE, MERCI DE VOUS RENDRE AU SERVICE DES PRE-ADMISSIONS APRES VOTRE CONSULTATION D'ANESTHESIE (service situé à l'accueil général)**

*Réservé au secrétariat d'anesthésie*

**Merci de remplir le questionnaire (page 2) et signer l'information médicale (page 4) pour préparer au mieux votre anesthésie.**

**Pour les enfants, merci de rapporter le carnet de santé et l'autorisation d'opérer complétée et signée par les deux parents.**

Vous avez rendez-vous le...../...../.....à.....h..... Avec le Docteur :.....

Date d'intervention : ...../...../..... Date d'entrée : ...../...../..... Heure d'entrée : .....h.....

Type d'intervention : .....

Ambulatoire  Hospitalisation complète

Nom du chirurgien : .....Nom du médecin traitant : .....

### **Veillez apporter**

- 1 : Votre carte vitale et votre carte de mutuelle.
- 2 : Vos ordonnances et analyses récentes, carte de groupe, électrocardiogramme, compte rendu de consultation spécialisée (cardiologue, pneumologue...)

Mme  Mr  Nom : ..... Prénom : .....

Date de naissance : ..... Votre profession : .....

Votre taille : ..... Votre poids : .....

Perte de poids dans les 6 derniers mois ?  Oui  Non – Si OUI, combien ? .....

Avez-vous déjà été opéré(e) :  Oui  Non – Si OUI, de quoi ? : .....

.....  
.....

Hospitalisation à l'étranger plus de 24h au cours de l'année passée :	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Maladie contagieuse (tuberculose, gale, autres...)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Etes-vous porteur d'une bactérie multirésistante (BMR) ou hautement résistante (BHRe) antibiotiques ?	aux <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Cardiovasculaire		Respiratoire	
<input type="checkbox"/> Angine de poitrine	<input type="checkbox"/> Infarctus	<input type="checkbox"/> Asthme	<input type="checkbox"/> Apnée du sommeil
<input type="checkbox"/> Arythmie	<input type="checkbox"/> Œdème des jambes	<input type="checkbox"/> Ronflement	<input type="checkbox"/> Pneumonie, Pleurésie
<input type="checkbox"/> Souffle au cœur	<input type="checkbox"/> Insuffisance cardiaque	<input type="checkbox"/> Bronchites	
<input type="checkbox"/> Hypertension artérielle		<input type="checkbox"/> Fumeur (.....cigarettes/jour)	
<input type="checkbox"/> Varices	<input type="checkbox"/> Artérite	<input type="checkbox"/> Autres : .....	
<input type="checkbox"/> Phlébites	<input type="checkbox"/> Embolies		

Neurologique		Digestif	
<input type="checkbox"/> Convulsions	<input type="checkbox"/> Sciatique	<input type="checkbox"/> Hépatite	<input type="checkbox"/> Mal des transports
<input type="checkbox"/> Accident Vasculaire Cérébral		<input type="checkbox"/> Ulcère	<input type="checkbox"/> Hernie iatale
<input type="checkbox"/> Pertes de connaissance		<input type="checkbox"/> Autres : .....	
<input type="checkbox"/> Autres : .....			

Allergique		Urinaires	
<input type="checkbox"/> Produits iodés		<input type="checkbox"/> Prostate	
<input type="checkbox"/> Médicaments :	<input type="checkbox"/> Autres : .....	<input type="checkbox"/> Insuffisance rénale	

Hémorragiques			
<input type="checkbox"/> Saignements prolongés après des opérations	<input type="checkbox"/> Saignements de nez fréquents		
<input type="checkbox"/> Règles très abondantes	<input type="checkbox"/> Hémophilie dans la famille	<input type="checkbox"/> "Bleus" fréquents	
<input type="checkbox"/> Transfusions : ..... (Si courrier de l'EFS, le transmettre au praticien)			

Autres maladies		Pour les enfants (Antécédents familiaux)	
<input type="checkbox"/> Diabète	<input type="checkbox"/> Glaucome	<input type="checkbox"/> Myopathie	<input type="checkbox"/> Strabisme
<input type="checkbox"/> Cholestérol	<input type="checkbox"/> Thyroïde	<input type="checkbox"/> Hyperthermie maligne	<input type="checkbox"/> Maladie neurologique
<input type="checkbox"/> Dépression	<input type="checkbox"/> Tétanie	<b>Pour les femmes</b>	
<input type="checkbox"/> Autres : .....		<input type="checkbox"/> Vous êtes enceinte	<input type="checkbox"/> Vous prenez la pilule

Quels sont les médicaments que vous prenez ? (Apportez **OBLIGATOIREMENT** vos ordonnances de médicaments)

Le matin : .....

Le midi : .....

Le soir : .....

Avez-vous déjà pris récemment d'autres médicaments : .....

Portez-vous une prothèse :  dentaire  auditive  lentille oculaire  autres :

Date :	Signature :
--------	-------------

# Information médicale sur l'anesthésie

Ce document est destiné à vous informer sur l'anesthésie. Nous vous demandons de le lire attentivement, afin de pouvoir donner votre accord à la procédure anesthésique qui vous sera proposée par le médecin anesthésiste réanimateur. Vous pourrez également poser à ce médecin des questions sur cette procédure. Pour les questions relatives à l'acte qui motive l'anesthésie, il appartient au spécialiste qui réalisera cet acte d'y répondre.

## ➤ Qu'est ce que l'anesthésie ?

L'anesthésie est un ensemble de techniques qui permet la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical (endoscopie, radiologie...), en supprimant ou en atténuant la douleur pendant et après l'intervention dans des conditions optimales de sécurité. Il existe deux grands types d'anesthésie : **l'anesthésie générale et l'anesthésie locorégionale**.

**L'anesthésie générale** est un état comparable au sommeil, produit par l'injection de médicaments, et/ou par la respiration de vapeurs anesthésiques.

L'anesthésie locorégionale permet de n'endormir que la partie de votre corps sur laquelle se déroulera l'opération. Son principe est de bloquer les nerfs de cette région, en injectant à leur proximité un produit anesthésique local. Dans certains cas, il est possible de prolonger l'insensibilisation plusieurs jours après l'opération en injectant ce produit dans un cathéter placé à proximité des nerfs.

**La rachianesthésie et l'anesthésie péridurale** sont deux formes particulières d'anesthésie locorégionale, où le produit anesthésique est injecté à proximité des nerfs qui sortent de la moelle épinière. Une anesthésie générale peut être associée soit de principe, soit devenir nécessaire en cas d'insuffisance ou d'échec de l'anesthésie locorégionale.

**L'hypnose médicale** peut être utilisée comme technique d'anesthésie pour certaines interventions ou actes endoscopiques. De façon plus informelle, l'hypnose peut favoriser le confort péri-opératoire lors de la pose de perfusion, lors de la réalisation d'anesthésies locorégionales, pour la mise en condition avant l'anesthésie générale ou lors du réveil. Cette technique est utile pour favoriser l'alliance entre le patient et le soignant.

Toute anesthésie, générale ou locorégionale, réalisée pour un acte non urgent, nécessite une consultation plusieurs jours à l'avance et **une visite pré-anesthésique**. La consultation d'anesthésie est effectuée par un médecin anesthésiste réanimateur. Au cours de cette consultation et de la visite pré-anesthésique, vous serez informé(e) des différentes techniques d'anesthésie possibles et adaptées à votre cas. Vous pourrez poser toutes les questions que vous jugerez utiles à votre information. À cette occasion, vous serez amené(e) à exprimer vos préférences.

Le choix du type d'anesthésie sera prévu en fonction de l'acte opératoire, de votre état de santé et du résultat des examens complémentaires éventuellement prescrits. **Le médecin qui pratiquera l'anesthésie** ne sera pas forcément celui que vous aurez vu en consultation. Il disposera de votre dossier médical et **en cas de nécessité, pourra choisir de modifier la technique prévue**. Des infirmiers anesthésistes diplômés d'état pourront participer à votre prise en charge sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste.

## ➤ Quels sont les risques de l'anesthésie ?

Tout acte médical, même conduit avec compétence et dans le respect des données acquises de la science, comporte un risque. Les conditions actuelles de surveillance de l'anesthésie et de la période du réveil, permettent de dépister rapidement la survenue d'anomalies et de les traiter. Aussi, les complications graves de l'anesthésie, qu'elles soient cardiaques, respiratoires, neurologiques, allergiques ou infectieuses, sont devenues très rares.

## ➤ Quels sont les inconvénients et les risques propres de l'anesthésie générale ?

- Des nausées et des vomissements peuvent survenir au réveil. Une rougeur douloureuse au niveau de la veine dans laquelle les produits ont été injectés peut s'observer.
- L'introduction d'un tube dans la trachée (intubation) ou dans la gorge (masque laryngé) pour assurer la respiration pendant l'anesthésie peut provoquer des maux de gorge ou un enrouement au décours de l'intervention.
- Des traumatismes dentaires sont également possibles. C'est pourquoi il est important de signaler toute prothèse ou toute fragilité dentaire particulière.
- La position prolongée sur la table d'opération peut entraîner des compressions, notamment de certains nerfs, ce qui peut provoquer un engourdissement ou, exceptionnellement, la paralysie d'un bras ou d'une jambe.
- Après anesthésie générale, des souvenirs de la période opératoire peuvent subsister. Des troubles de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures qui suivent l'anesthésie.

Tous les symptômes précédemment cités sont habituellement passagers et leur persistance doit vous inciter à consulter. Les accidents liés au passage de vomissements dans les poumons sont très rares si les consignes de jeûne sont bien respectées. Des complications imprévisibles comportant un risque vital comme une allergie grave, un arrêt cardiaque, une asphyxie, sont extrêmement rares.

## ➤ Quels sont les inconvénients et les risques propres aux anesthésies locorégionales ?

Toute anesthésie locorégionale peut s'avérer incomplète et nécessiter un complément d'anesthésie, voire une anesthésie générale. Cela justifie les mêmes consignes de jeûne que pour une anesthésie générale.

Il existe des risques spécifiques à l'anesthésie périmédullaire (rachianesthésie, anesthésie péridurale). Une répétition de la ponction peut être nécessaire en cas de difficulté. Une difficulté à uriner peut nécessiter la pose temporaire d'une sonde urinaire. Des maux de tête peuvent survenir et nécessiter parfois un repos de plusieurs jours et/ou un traitement spécifique. Très rarement, on peut observer une baisse passagère de l'audition, ou un trouble de vision. Des douleurs au niveau du point de ponction, dans le dos, sont également possibles.

Il existe des risques spécifiques aux autres anesthésies locorégionales. Ainsi, au cours de l'anesthésie de l'œil, des complications, telles que la diplopie (le fait de voir double) ou plus rarement une plaie oculaire, peuvent survenir. Des séquelles, passagères ou définitives, telles qu'une baisse ou une perte de la vision, peuvent en résulter. Au cours de certaines anesthésies du membre supérieur ou du thorax, des complications respiratoires sont possibles.

En fonction des médicaments associés, des nausées, des vomissements, des démangeaisons, des troubles passagers de la mémoire ou une baisse des facultés de concentration peuvent survenir dans les heures suivant l'anesthésie.

Toutes les techniques d'anesthésie locorégionale peuvent donner lieu à des complications graves mais rares: paralysie et/ou insensibilité plus ou moins étendues, temporaires ou permanentes, accident cardiovasculaire, convulsions, blessure d'un organe proche.

Les complications graves liées à l'anesthésie générale ou à l'anesthésie locorégionale ne sont pas les mêmes, mais **au final, aucune technique ne paraît plus risquée qu'une autre. Chacune de ces techniques a des avantages et des inconvénients spécifiques.**

Je, soussigné(e) (Nom / Prénom) ..... Né(e) le : .....  
reconnais avoir été suffisamment informé sur l'anesthésie et ses risques et accepte la procédure anesthésique proposée.

Date et signature :

**Pour les mineurs :**

Signature de la mère :

ET

Signature du père :

En cas d'absence de l'un des titulaires de l'autorité parentale :

Atteste sur l'honneur être le seul titulaire de l'autorité parentale (adresser la copie du jugement)

Atteste sur l'honneur ne pas connaître ses coordonnées et n'avoir plus aucun contact me permettant de lui remettre le présent document

Nom/Prénom et Signature